



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вайнера ул., д.34-б
г. Екатеринбург, 620014
телефон/факс (343) 312-00-03
E-mail: minzdrav@egov66.ru

ОКПО 00073341, ОГРН 1036603497028

ИНН/КПП 6660010415/667101001

04 МАЙ 2018

№ 03-01-82/4289

На № _____ от _____

О направлении Методической
таблицы по выписке, учету,
хранению и отпуску лекарственных
препаратов и иных веществ,
подлежащих различным видам
контроля

Для изучения и использования в практической деятельности направляем
Методическую таблицу по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных
препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля,
подготовленную Министерством здравоохранения Свердловской области
совместно с ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».

Приложение на 51 л.

Министр

А.И. Цветков

Юлия Борисовна Шишкина
(343)312-00-03 (доб. 928)



Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Свердловский областной медицинский колледж»

Справочное пособие

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля

дисциплина Фармакология

Одобен
на областном методическом объединении
медико-биологических дисциплин
Протокол № 2 от 06.04.2018г.
/Никитина Г.А./

Согласовано на заседании ЦМС
Протокол № 9 от «11» 04 2018г.

УТВЕРЖАЮ
Зам. Директора по НМР
/О.В. Ледянкина/

Составлен в соответствии с ФГОС СПО
по специальностям:
31.02.01.Лечебное дело СПО углубленной
подготовки очная форма обучения
34.02.01 Сестринское дело СПО базовой
подготовки очная форма обучения
34.02.01 Сестринское дело СПО базовой
подготовки очно-заочная форм обучения
31.02.02 Акушерское дело СПО базовой
подготовки очная форма обучения

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля рекомендована для студентов медицинских вузов, колледжей и специалистов практического здравоохранения, которые могут осуществлять назначение и выписывание лекарственных препаратов.

Составители: Шишкина Юлия Борисовна, главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области.
Кузьмина Галина Викторовна, преподаватель фармакологии высшей квалификационной категории ГБПОУ "СОМК"

Пояснительная записка

Согласно приказа МЗ РФ от 20.12.2012г № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (ред. от 21.04.2016 № 254н) назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется *лечащим врачом, фельдшером, акушеркой* в случае возложения на них полномочий лечащего врача в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения на *фельдшера, акушерку* руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по *назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты*"

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля содержит:

1. Международное непатентованное наименование (МНН) лекарственных средств в алфавитном порядке, торговые названия (ТН).
2. Зарегистрированные лекарственные формы.
3. Образец выписки рецепта.
4. Основания для применения мер контроля.
5. Подлежит лекарственное средство предметно-количественному учету.
6. Правила хранения: подлежит хранению в укрепленном и оснащем ОПС помещении.
7. Форма рецептурного бланка .
8. Предельная норма отпуска лекарственного средства на 1 рецепт.
9. Примечания: фармако-терапевтическая группа (ФТГ), код анатомо-терапевтическая-химическая классификация (АТХ), сроки хранения рецептов в аптечной организации .

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля составлена на основании документов:

1. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012г № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков

- на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (ред. от 21.04.2016 № 254н)
2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"
 3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного Кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного Кодекса РФ"
 4. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ"
 5. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 № 157н "Об утверждении предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах"
 6. Приказ Минздрава России от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества"
 7. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету"
 8. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н. "Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"
 9. Постановление Правительства РФ от 9.06.2010 № 419 "Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ"

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля
в редакции от 01.11.2020

1	МНН (ТН)	зарегистрированные лекарственные формы (курсимом - лекарственные формы, регистрация которых ожидается)	3	образец выписки рецепта	основания для применения мер контроля	подлежит предметно-количественному учету	подлежит хранению в установленном ОПС	форма рецептурного бланка	предельная норма отпуска на 1 рецепт	примечания
1	2			4	5	6	7	8	9	10
1	Агомелатин (Вальдоксан)	таблетки по 25 мг		Rp: Tabl. Agomelatini 25 mg D.t.d. № 98 *S. По 1 табл. однократно перед сном	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX22 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
2	Азенапин (Сафрис)	таблетки подязычные 10 мг		Rp: Tabl. Azenapini 10 mg D.t.d. №100 *S. Под язык 1 таблетка 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AH05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
3	Алпразолам (Алзолам, Золомакс, Неурол, Хелекс, Хелекс СР)	таблетки по 0,25 мг таблетки по 1 мг		Rp: Tabl. Alprazolami 0, 25 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, независимо от приема пищи.	ЛП Списка III	+	х	148-1/y-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
4	Аминофенилмасляная кислота (Анвифен, Ноофен, Фенибут, Фенорабин кидс) (в ред от 02.03.2020)	капсулы по 25 мг таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг таблетки, капсулы по 250 мг		Rp: Acidi Aminophenylbutyrici 250mg D.t.d. №100 in cap. *S. По 1 таб. 3 раза в день курсами по 2-3 недели	меры контроля не установлены (в ред от 02.03.2020)			107-1/y		ФТГ другие психостимуляторы и ноотропные препараты код АТХ N06B (в ред от 02.03.2020)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Амисульприд (Лимипранил, Солиан)	таблетки по 100 мг таблетки по 400 мг раствор для приема внутри 100 мг/мл, флаконы	Rp: Sol. Amisulpridi 100 mg/ml-60 ml D.*S по 4 мл 1 раз в день Rp: Tabl. Amisulpridi 400 mg D.t.d. №30 *S По 1 таблетке 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AL05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
6	Амитриптилин (Амитриптилин, Саротен Ретард)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг капсулы продолжительного действия по 50 мг 1 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp: Tabl. Amitriptylini 10 mg D.t.d. №50 *S.Внутри 1 таблетка 2 раза в сутки во время или после еды Rp: Amitriptylini 50 mg D.t.d. №50 in caps. prolong. *S. Внутри 1 капсуле 2 раза в сутки во время или после еды	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AA09 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
7	Аринипразол (Абилифай, Алембик Пипзол, Амдоал, Аринипразол ОД-Тева, АРИПРИЗОЛ, Зилаксер)	таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки по 30 мг таблетки диспергируемые в полости рта по 30 мг	Rp: Tabl. Arripirazoli 10 mg D.t.d. № 50 * S.Внутри 1 таб. 1 раз в сутки независимо от приема пищи	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AX12 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
8	Ангидрид кислоты (в концентрации 10% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор ИС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ацетон (в концентрации 60% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
10	Бензобарбитал (Бензонал)	таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Rp: Tabl. Benzobarbitali 100 mg D.t.d. № 50 *S. Внутрь по 1 таб. 3 раза в сутки, после еды.	СВ	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Противосудорожные средства рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
11	1,4-бутандиол (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
12	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (Феназеф, Фезинам, Феназепам, Фензитаг, Фенорелаксан, Транквицитам, Элзепам)	таблетки по 0,5 мг таблетки по 1 мг таблетки по 2,5 мг 0,1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 1 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь 1 таб. за 20-30 мин до сна. Rp.: Sol. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 0,1% - 1 ml D.t.d. №10 in amp. *S В/м п 1мл 1 раз в день.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитики код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца с 22.03.2021 будет внесен в список сильнодействующих веществ, возможно изменение мер контроля
13	Бупренорфин (Бупранал, Бупренорфина гидрохлорид, Транстек)	0,03 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций трансдермальная терапевтическая система (ТТС) в дозировках по 35 мкг/час, 52,5 мкг/час, 70 мкг/час	Rp.: Sol. Buprenorphini 0,03% - 1 ml D.t.d. №30 (тридцать) in amp. *S. В мышцу 2 мл при болевом синдроме Rp.: STT Buprenorphini 70 mkg/h D.t.d. 5 *S. Трансдермальная терапевтическая система накладывается на 72 ч.	НС	+	х	специальный рецептурный бланк 107/у-НП; пластыри на бланке 148-1/у-88	30 ампул (шприц-тюбики); 20 пласт. - 35 мкг/ч; 10 пласт. - 52,5 мкг/ч; 5 пласт. - 70 мкг/ч ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Бупренорфин 0,2 мг, (Бупраксон) Налоксон 0,2 мг	таблетки подязычные	Rp.: Buprenorphini 0,2 mg Naloxoni 0,2 mg D.t.d. №20 in tab. *S. По 1-2 табл. под язык (не разжевывая, не глотая) каждые 6-8 ч.	НС	+	х	148-1/y-88	60 таблеток (упаковка, кратная № 20) ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
15	Бупирон (Спитомин)	таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Buspironi 5 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Дофаминиметики, Анксиолитики код АТХ N05BE01
16	Буторфанол (Буторфанола тартрат, Веро-Буторфанол, Стадол)	0,2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Butorphanoli 0,2% - 1 ml D.t.d. №20 in amp. *S. В/м 1мл.однократно	ПВ Списка III	+	х	148-1/y-88	20 ампул 0,2% раствора по 1 мл ²	Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
17	Венлафаксин (Алвента, Велафакс, Велафакс МВ, Воксемель, Ньювелонг, Эфевелон, Эфевелон ретард)	таблетки по 25 мг таблетки по 37,5 мг таблетки по 75 мг капсулы продолжительного действия по 37,5 мг, по 75 мг, по 150 мг таблетки	Rp.: Venlafaxini 75 mg. D.t.d.: № 28 in caps. prolong. *S. Принимать по 1 капсуле в сутки в одно и то же время.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX16 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
18	Вортиоксетин (Бринтелликс)	таблетки по 15 мг	Rp.: Tabl. Vortioxetini 15 mg D.t.d. №28 *S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX26 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Галоперидол (Сенорм)	таблетки по 1,5 мг таблетки по 2 мг таблетки по 5 мг 0,2 % раствор, капли для приема внутрь 0,5% раствор в ампулах по 1 мл или 2 мл для инъекций 5 % масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Tabl. Haloperidoli 1,5 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день за полчаса до еды. Rp.: Sol. Haloperidoli 0,2%- 30 ml D.*S. по 5 капель 2 раза в день Rp.: Sol. Haloperidoli oleosae 5%-1ml D.t.d. №10 in amp. *S. В/м 1 мл. 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AD01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
20	Гексобарбитал (Гексенал) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения по 1,0 г	стационарный ЛП, используется для наркоза	СВ	+		-		используется для наркоза, по рецептам не отпускается
21	Гестринон (Неместран)	капсулы по 2,5 мг	Rp.: Hestrinoni 2,5 mg D.t.d. №8 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле по схеме.	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Гестаген рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
22	Гидразинокарбонилметил- бромфенилгидробензидиа- зепин (Диамидазепам)	таблетки по 20 мг таблетки по 50 мг	Rp.: Tabl. Hydrazinocarbonylmethylbromphe- nyldihydrobenzidiazepini 20 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь 1 таб. 3 раза в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BA рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Гидрохизин (Атаракс)	таблетки по 25 мг 5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Hydroxyzini 25 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь 1 таб. 1 раз в сутки Rp.:Sol. Hydroxyzini 5%-2 ml D.t.d. №5 in amp. *S В/м по 1мл. ЛП по коду АТХ				107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BB01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
24	Даназол (Данол)	капсулы по 100 мг капсулы по 200 мг	Rp.: Danazoli 0,2 D.t.d. № 60 in caps. *S. Внутрь по 1 капсуле 2 раз в сутки	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Гонадотропных гормонов секрции ингибитор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
25	Дулоксетин (Дулоксента, Симбалта)	капсулы по 30 мг	Rp.: Duloxetine 30 mg D.t.d. №30 in caps. *S: Внутрь по 1 капсуле в день ЛП по коду АТХ				107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX21 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
26	Диазепам (Апаурин, Реланиум, Релиум, Седуксен, Сибазон)	таблетки по 5 мг 0,5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Diazepam 5 mg D.t.d. №30 *S.Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день Rp.:Sol. Diazepam 0,5%- 2 ml D.t.d. №5 in amp. *S.В/м1 мл.2раза всутки ПВ Списка III				148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
27	Дигидрокодеин (ДПК Континус) (по состоянию на 02.03.2020 не зарегистрирован в РФ)	таблетки пролонгированного действия по 60 мг, 90 мг, 120 мг	Rp.: Dihydrocodeini 60 mg D.t.d. №40 (сорок) in tab. prolongatis *S.Внутрь по 1 таблетке каждые 12 часов	НС	+	х	специальный рецептурный бланк 107/у-НП	40 таблеток по 60мг; 30 таблеток по 90 мг; 20 таблеток по 120 мг ²	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	декстрометорфана гидробромид 0,02 г (20 мг), парацетамол 0,65 г (650 мг), хлорфенирамин 0,04 г (40 мг), аскорбиновая кислота 0,25 г (250 мг), кофеин 0,03 г (30 мг) (Инфлюблэк) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь	Rp.: Dextromethorphan hydrobromidi 0,02 Paracetamoli 0,65 Chlorphenirami 0,04 Acidi ascorbinici 0,25 Coffeini 0,03 D.t.d. №10 *S. Внутрь 1 пакетик 3 раза в сутки каждые 8 часов, предварительно растворить содержимое пакетика в ½ стакана горячей воды	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Парацетамол в комбинации с психолептиками содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "д" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
29	декстрометорфана гидробромид 0,015 г (15 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), хлорфенирамина малеат 0,002 г (2 мг), фенилэфрина гидрохлорид 0,01 (10 мг) (Тофф плюс)	капсулы	Rp.: Dextromethorphan hydrobromidi 0,015 Paracetamoli 0,5 Chlorphenirami maleatis 0,002 Phenylephrini hydrochloridi 0,01 D.t.d. №10 in caps. *S. Внутрь по 1 капсуле каждые 4-6 часов	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		Парацетамол в комбинации с психолептиками содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "д" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
30	декстрометорфана гидробромид 0,015 г (15 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), псевдоэфедрина гидрохлорид 0,03 г (30 мг), аскорбиновая кислота 0,062 г (62 мг) (Каффетин Колд)	таблетки	Rp.: Dextromethorphan hydrobromidi 0,015 Paracetamoli 0,5 Pseudoephedrini hydrochloridi 0,03 Acidi ascorbinici 0,062 D.t.d. №10 in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке 4 раза в день	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	декстрометорфана гидробромид 0,0075 г (7,5 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг) (Инфлюнет Эйр Стоп Тос, Падевикс)	таблетки шипучие	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве,
32	на 100 мл сиропа: декстрометорфана гидробромид 0,2 г (200 мг), терпингидрат 0,2 г (200 мг), левоментол 0,075 г (75 мг) (Гликодин)	сироп	Rp.:Dextromethorphan hydrobromidi 0,2 Terpingidra Levomentoli 0,075 Sacchari syupi 100 ml D*S. Внутрь 1 чайная ложка 3 раза в день	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н
33	МНН нет, ТН Колдрекс Найт на 100 мл сиропа содержит: декстрометорфана гидробромид 0,075 г (75 мг), парацетамол 5 г, прометазина гидрохлорид 0,1 г (100 мг)	сироп	Rp.:Sir. «Coldrex Nite» 100ml D*S. Внутрь по 4 чайные ложки на ночь	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство+противокашлевое опиоидное средство+H1-гистаминовых рецепторов блокатор) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	на 100 мл сиропа: декстрометорфан гидробромид моногидрат 0,2 г (200 мг), фенилэфрин гидрохлорид 0,1 г (100 мг), хлорфенамин maleat 0,04 г (40 мг) (Терасил-Д)	сироп	Rp.:Dextromethorphan hydrobromidi monogidrat 0,015 Phenylephrini hydrochloridi 0,1 Chlorphenirami maleati 0,04 Sacchari syrupi 100 ml D* S. Внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в сутки, запивая небольшим количеством воды	комбинированный и ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
35	на 100 мл сиропа: декстрометорфана гидробромид 0,2 г (200 мг), гвайфенезина 2 г (Туссин плюс) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	сироп	Rp.:Dextromethorphan hydrobromidi 0,2 Guaifenesini 2,0 Sacchari syrupi 100 ml D* S. Внутрь по 2 чайной ложке каждые 4 часа после еды	комбинированный и ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
36	Залеплон (Анданте)	капсулы по 5 мг	Rp.: Zaleploni 5 mg D.t.d. №14 in caps. *S. Внутрь перед сном по 1 капсуле	ЛП по коду АТХ			107-1/у- ⁵		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CF03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
37	Зипрасидон (Зелдокс, Зипсила)	капсулы по 20 мг капсулы по 80 мг лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения флаконы по 30 мг	Rp.: Ziprasidoni 0,02 D.t.d. №56 in caps. *S. Внутрь во время еды по 1 капсуле 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у- ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Змеиный яд (за исключением лекарственных форм для наружного применения - кремы, мази, гели)	в чистом виде не применяется			+		-		
39	Золпидем (Гипноген, Зольсана, Ивадал, Нитрест, Онириа, Санвал, Сновител)	таблетки по 10 мг	Rp.: Zolpidemi 10 mg D.t.d. № 30 in tab. *S. Внутрь по ½ таблетки за час до сна.	ПВ Списка III	+	x	148-1/y-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
40	Зопиклон (Имован, Пиклодорм, Релаксон, Сомнол, Торсон)	таблетки по 7,5 мг	Rp.: Zopicloni 7,5 mg D.t.d. № 10 in tab. *S. По 1 таблетке перед сном	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
41	Зуклопентиксол (Клопиксол акуфаз, Клопиксол депо, Клопиксол)	таблетки по 2 мг таблетки по 10 мг 5 % масляный раствор в ампулах по 1 мл или по 2 мл для инъекций 20 % масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Zuclorentinixoli 0,002 D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке в сутки Rp.: Sol. Zuclorentinixoli oleosae 5%-1 ml D.t.d. №10 in amp. *S. В мышцу 1 мл каждые 2 недели	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AF05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Имипрамин (Мелипрамин)	таблетки по 25 мг драже по 25 мг 1,25 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Рр.: Tabl. Imipramini 0,025 D.t.d. №20 * S. По 1 таблетке 3 раза в сутки. Рр.: Sol. Imipramini 1,25%-2 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. В мышцу по 2 мл 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
43	Калия перманганат (в концентрации 45% и более)	порошок для приготовления раствора	без рецепта	прекурсор НС и ЛП	+		отпускается без рецепта врача ³		отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
44	Карбахол (Карбахолин, МИОХОЛ)	0,01% раствор во флаконах по 1 мл для внутриглазного введения	Рр.: Sol. Carbacholini 0,01%-1 ml D.t.d. №10 *S. В каждый глаз по 1 капле 3 раза в сутки	яв	+		148-1/y-88		ФТГ М- и Н-холиномиметик рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
45	Карипразин (Реагил)	капсулы по 1,5 мг, 3 мг, 4,5 мг, 6 мг	Рр.: Cariprazini 1,5 mg D.t.d. № 50 in caps. *S Внутрь 1 капсуле 1 раз в день.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AX15 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
46	Кветиапин (Виктоэль, Гедонин, Кветиакс, Кветиакс СР, Кветиапин Канон Пролонг, Кветитекс, Кетиап, Кетилепт, Кументаль, Лаквель, Нантарид, Сервитель, Сероквель, Сероквель Пролонг)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг таблетки по 150 мг таблетки по 200 мг таблетки пролонгированного действия по 50 мг, 150 мг, 200 мг	Рр.: Quetiapini 0,2 D.t.d. № 60 in tab. prolongatis *S. Внутрь по 1 таблетке в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AH04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Кетамин (Кетамин гидрохлорид)	5 % раствор ампулах по 2 мл для инъекций	в стационарный ЛП, по рецептам не отпускается	ПВ Списка II	+	х	-	-	используется для наркоза только в условиях стационара, по рецептам не отпускается
48	Клобазам (Фризиум)	таблетки 10 мг	Rp: Clobazami 10 mg D.t.d. № 100 in tab. *S Внутрь, 1 таб. после еды, 2 раза в день.	ПВ Списка III	+	х	148-1/y-88	-	ФТГ Производные бензодиазепина рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
49	Клозапин (Азалептин, Клозастен, Лепонекс)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг	Rp: Clozapini 25 mg D.t.d. № 50 in tab. *S Внутрь, 1 таб. после еды, 2-3 раза в день.	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ антипсихотическое средство (нейролептик) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
50	Кломипрамин (Анафранил, анафранил СР, Клофранил)	таблетки по 25 мг таблетки пронгитированного действия по 75 мг 1,25 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Clomipramini 0,025 D.t.d. № 30 *S Внутрь по 2 табл. 2 раза в сутки Rp.: Sol. Clomipramini 1,25% -2 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. В мышцу по 25 mg в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
51	Клоназепам	таблетки по 0,5 мг таблетки по 2 мг	Rp.: Tabl. Clonazepam 2 mg D.t.d. № 30 * S. Внутрь по 1 табл. 2 раза в сутки.	ПВ Списка III	+	х	148-1/y-88	-	ФТГ Противозипелитическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Клонидин (Клофелин)	таблетки по 0,075 мг таблетки по 0,15 мг 0,01% раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 0,25% раствор глазные капли	Rp.: Clonidini 0,075 mg D.t.d. № 50 in tab. * S. Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки Rp.: Sol. Clonidini 0,01%- 1ml D.t.d. №5 in amp. * S. В/м 1 мл 2 раза в сутки Rp.: Sol. Clonidini 0,25%- 5 ml D. * S. По 1-2 капли 2-3 раза в день в каждый глаз.	СВ	+		148-1/у-88	нет (в ред от 02.03.2020)	ФТГ Гипотензивное средство центрального действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
53	Кодеин (кодеина основание, кодеина фосфат)	субстанция		НС	+	х	специальный рецептурный бланк 107/у-НП	-	рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
54	кодеина фосфат сесквигидрат 0,01 г (10 мг), парацетамол 0,25 г (250 мг), пропифеназон 0,21 г (210 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), (Каффетин) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis sesquigidiati 0,01 Paracetamoli 0,25 Propiphenazoni 0,21 Coffeini 0,05 D.t.d. № 20 in tab. * S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	кодеина фосфат 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Коделмикст®) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 0,008 Paracetamoli 0,5 D.t.d. № 30 in tab. * S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
56	кодеин 0,008 г (8 мг), травы термопсиса ланцетного 0,02 г (20 мг), натрия гидрокарбоната 0,2 г (200 мг), солодки корней в порошке 0,2 г (200 мг) (Коделак) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	таблетки	Rp.: Codeini 0,008 Herbae Thermopsideis lanceolatae 0,02 Natrii hydrocarbonatis 0,2 Radices Glycyrrhizae 0,2 D.t.d: № 20 in tab. S: Внутрь, по 1 табл. 2-3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
57	на 100 мл сиропа: кодеина фосфата – 0,09 г (90 мг), экстракта термопсиса сухого – 0,2 г (200 мг), экстракта корня солодки сухого – 3,3 г, экстракта чабреца жидкого – 20,0 г (Коделак фито) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	сироп	Rp.: Codeini phosphatis 0,09 Extr. Thermopsideis sicci 0,2 Extr. radices Glycyrrhizae spissi 3,3 Extr. Thymusi fluidi 20,0 Sacchari syrupi ad 100 ml D. *S. По 10 мл 3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	кодеин 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг)	таблетки	Rp.: Codeini 8 mg Paracetamoli 500 mg D.t.d. №20 in tab. * S: Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
59	кодеина фосфат (в форме гемигидрата) 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), дротаверина гидрохлорид 0,04 г (40 мг) (Юниспаз)	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 8 mg Drotaverini hydrochloridi 40 mg Paracetamoli 500 mg D.t.d. №24 in tab. * S: Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство+спазмолитическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
60	кодеин 0,01 г (10 мг), ибупрофен 0,2 г (200 мг) (Нурофен® плюс)	таблетки	Rp.: Codeini 10 mg Ibuprofeni 200 mg D.t.d. №20 in tab. * S: По 1 таблетке 3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	кодеин фосфат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,03 г. (30 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Солпадеин) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	таблетки таблетки растворимые	Rp.: Codeini phosphatis 0,008 Coffeini 0,03 Paracetamoli 0,5 D.t.d. №24 in tab. S. Внутрь по 2 табл. до 4 раз в сутки	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
62	кодеин фосфат полугидрат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,03 г. (30 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Солпадеин) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	капсулы	Rp.: Codeini phosphatis 0,008 Coffeini 0,03 Paracetamoli 0,5 D.t.d. № 30 in caps. *S: Принимать по 1 табл. при боли	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
63	кодеина 0,008 г (8 мг), терпингидрат 0,25 г (250 мг), натрия гидрокарбоната 0,25 г (250 мг) (Терпинкод)	таблетки	Rp.: Codeini 0,008 Terpinhydrati 0,25 Natrii hydrocarbonatis 0,25 D.t.d. № 20 in tab. *S. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	МНН нет, ТН Пентабуфен® содержит: кодеин фосфат 0,008 г (8 мг) или кодеин 0,006 г (6 мг), метамизол натрий 0,3 г (300 мг), ибупрофен 0,2 г (200 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг)	таблетки	Рр.: Tabl. «Pentabufenum» №30 D *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки, запивая водой.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
65	МНН нет, ТН Пиралгин состав: кодеин 0,008 г (8 мг), метамизол натрий 0,3 г (300 мг), напроксен 0,1 г (100 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг)	таблетки	Рр.: Tabl. «Pyralgium» №20 D *S: Внутрь, по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
66	кодеина фосфат 0,008 г (8 мг), пропифеназон 0,25 г (250 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг) (Пенталгин Плюс) По состоянию на 02.03.2020 регистрация в ГРЛС отсутствует	таблетки	Рр.: Codeini phosphatis 8mg Coffeini 50 mg Paracetamoli 300 mg Propyphenazoni 250 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. № 24 in tab. *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	кодеин фосфат (моногидрат) 0,008 г (8 мг), кофеин 0,05 г. (50 мг), метамизол натрия 0,3 г (300 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), фенobarбитал 0,01 г (10 мг) (Сантопералгин)	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 8mg Coffeini 50 mg Methamizoli natrii 300 mg Paracetamoli 300 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. 30 in tab. *S: Внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
68	МНН нет, ТН Тетралгин® состав: кодеина моногидрат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), метамизол натрия 0,3 г (300 мг), фенobarбитал 0,01 г (10 мг)	таблетки	Rp.: Tabl. «Tetralginum» №20 D.*S: Внутрь по 1 таблетке при боли	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+анальгезирующее ненаркотическое средство+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
69	кодеин фосфат (гемигидрат) 0,01 г (10 мг), кофеин 0,05 г. (50 мг), метамизол натрия 0,15 г (150 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), фенobarбитал 0,015 г (15 мг) (Седал-М, Седалгин-Нео)	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 0,01 Coffeini 0,05 Methamizoli natrii 0,15 Paracetamoli 0,3 Phenobarbitali 0,015 D.t.d. № 20 in tab. *S: Принимать по 1 таблетке при боли	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+анальгезирующее ненаркотическое средство+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Кокаин гидрохлорид)	(кокаина субстанция							ФТГ Местный анестетик рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
71	Левомепромазин (Тизерцин)	таблетки по 25 мг 2,5 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Levomepromazini 25 mg D.t.d. № 28 in tab. *S. Внутрь по 1 табл. 2 раза в день Rp.: Sol. Levomepromazini 2,5%- 1 ml D.t.d. №5 in amp. *S B/м 1 мл 2 раза в сутки	НС	+	х	специальны й рецептурны й бланк 107/у-НП	-	ФТГ Нейролептики рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
72	Лития карбонат (Седалит)	таблетки 300 мг	Rp.: Lithii carbonatis 300 mg D.t.d. №50 in tab. *S: Внутрь по 3 таблетки 3 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Нормотимическое средство код АТХ N05AN01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
73	Лоразепам (Лорафен)	таблетки по 1 мг таблетки по 2,5 мг	Rp.: Lorazepam 1 mg D.t.d. № 25 in tab. *S. Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
74	Луразидон (Латуда)	таблетки по 20 мг	Rp.: Tabl. Lurasidoni 20 mg D.t.d. № 28 *S: Внутрь по 2 табл. 1 раз в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE05
75	Мапротилин (Люддиомил)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг	Rp.: Tabl. Maprotilini 25 mg D.t.d. №30 *S.Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA21 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Медазепам (Мезапам, Рудотель)	таблетки по 10 мг	Rp.: Medazepamі 10 mg D.t.d. № 50 in tab. *S. Внутрь перед приемом пищи, 3 раза в сутки по 1 таблетке.	ПВ Списка III	+	x	148-1/y-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
77	Мелатонин (Циркадин)	таблетки пролонгированного действия по 2 мг	Rp.: Melatoninі 2 mg D.t.d. №30in tab.prolong. *S. По 1 таблетке перед сном	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CH01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
78	Миансерин (Леривон)	таблетки по 30 мг	Rp.: Tabl. Mianserinі 30 mg D.t.d. №10 *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
79	Мидазолам (Дормикум, Мидазолам-хамельн, Фулсед)	0,5% раствор в ампулах по 1 мл и по 3 мл для инъекций	Rp.:Sol. Midazolami 5 mg/ml – 1ml D.t.d. № 10 in amp. *S. Вводить внутримышечно по 1 мл.	ПВ Списка III	+	x	148-1/y-88	-	ФТГ Снотворное и седативное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Милнаципран (Иксел)	капсулы по 25 мг	Rp.: Milnaciprani 25 mg D.t.d №50 in caps. *S: 2 таблетки 2 раза в сутки, в первой половине дня.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX17 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
81	Миртазапин (Каликста, Мирзатен, Мирзатен Кутаб, Миртазонал, Мирталан, Ноксибел, Ремерон, Эспритал)	таблетки по 15 мг таблетки по 30 мг таблетки по 45 мг таблетки для рассасывания по 15 мг	Rp.: Tabl. Mirtazapini 30 mg D.t.d. №30 *S. По 1 таблетке 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX11 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
82	Морфин (Морфина гидрохлорид, Морфина сульфат, МСТ континус)	таблетки пронгированного действия по 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг капсулы пронгированного действия по 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг 1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций таблетки по 5 мг, 10 мг капли для приема внутрь 20мг/мл 20 мл раствор для приема внутрь (монодозы)	Rp.: Morphini 100 mg D.t.d.№ 20 (двадцать) in tab. seu caps. prolongatis *S. Внутрь, не разжевывая, каждые 12 часов по 1 таблетке (капсуле) Rp.: Sol. Morphini 10 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 20 (двадцать) in амр. *S. Вводить подкожно 1мл. при прорывах боли Rp.: Morphini 10 mg D.t.d.№ 20 (двадцать) in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке 6 раз в день Rp.: Gtt. peror. Morphini 20 mg/ml - 20 ml D.t.d № 1 (один флакон) *S. внутрь по 10 капель при болях				специальны й рецептурны й бланк 107/y-НП	100 таблеток по 5 мг или 10 мг; 20 ампул (шприц- тюбиков); 180 таблеток (капсул) пронг. по 10 мг; 60 таблеток (капсул) пронг. по 30 мг; 40 таблеток (капсул) пронг. по 60 мг; 20 таблеток (капсул) пронг. по 100 мг; 20 таблеток (капсул) пронг. по 200 мг	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		по 5 мл - 2мг/мл; 6мг/мл; 20мг/мл	Рр.: Sol. peror. Morphini 2 mg/ml - 5 ml D.t.d.№ 60 (шестьдесят) in амр. *S. внутрь по 5 мл 6 раз в день					4 флакона по 20 мл (капли для приема внутрь); 100 ампул п/э по 5 мл р-ра 2мг/мл; 80 ампул п/э по 5 мл р-ра 6мг/мл; 30 ампул п/э по 5 мл р-ра 20мг/мл ²	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Морфолиноэтилтиогтоксиб бензимидазол (Нейрофазол)	0,5 % концентрат для приготовления инфузий во флаконах по 2 мл	Rp.: Morpholinoethylthioethoxy- benzimidazole 0,5%-2ml D.t.d. № 10 *S. Для инфузий	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитики код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
84	Метилакрилат (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
85	Метилметакрилат (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
86	Налбуфин (Налбуфина гидрохлорид, Серб)	2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Nalbuphini 20 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 50 in amp. *S. Вводить внутримышечно по 1 мл.	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	50 ампул 1% раствора по 1 мл; 25 ампул 2% раствора по 1 мл ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
87	Нандролон (Ретаболил)	5% масляный растор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Sol. Nandroloni oleosae 50 mg/ml - 1 ml D.t.d №1 in amp *S. В мышцу 1 мл. каждые 3- 4 недели	СВ	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Анаболики рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
88	Натрия оксibuтират (Натрия оксибат)	20 % раствор в ампулах по 5 мл для инъекций	в стационарный ЛП, используется для наркоза	ПВ Списка III	+	х	-		ФТГ Наркотические средства, Антигипоксанта и антиоксиданты в ампулах используется для наркоза, по рецептам не отпускаются
89	Нитразепам	таблетки по 5 мг	Rp.: Tabl. Nitrazepamі 5 mg D.t.d. №20 *S. По 1 таб. за 30 минут до сна.	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Оксазепам (Нозепам, Тазепам)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Oxazepamі 10 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь, по 1табл. 2-3 раза в сутки	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
91	Оланзапин (Заласта, Заласта Кутаб, Зипрекса, Зипрекса Зидис, Нормитон, Оланекс, Парнасан, Эголанза)	таблетки по 2,5 мг таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки по 20 мг таблетки диспергируемые по 10 мг, по 15 мг, по 20 мг	Rp: Tabl. Olanzapini 15 mg D.t.d. №30 *S. По 1 таб. 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AH03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
92	Омнопон	1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Omnoponi 1 %- 1ml D.t.d. №20 (двадцать) in amp. *S. Подкожно по 1 мл	НС	+	х	специальны й рецептурны й бланк 107/у-НП	20 ампул 1% раствора по 1 мл; 20 ампул 2% раствора по 1 мл ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики в комбинациях рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
93	Оксикодон 5 мг, Налоксон 2,5 мг (10мг+5мг; 20 мг+10 мг; 40 мг+20 мг) (Таргин)	таблетки продолжительного действия	Rp.: Oxycodoni 5 mg Naloxoni 2,5 mg D.t.d. №100 in tab. prolongatis *S. Внутрь 1 таб. каждые 12 часов	НС	+	х	148-1/у-88	100 табл. (5 мг + 2,5 мг) 60 табл. (10 мг + 5 мг) 40 табл. (20 мг + 10 мг) 20 табл. (40 мг + 20 мг)	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство: опиоидных рецепторов агонист-антагонист рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Палиперидон (Инвега, Ксеплион, Тревикта)	таблетки пролонгированного действия по 3 мг и по 12 мг 10 % суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия в шприце по 0,25 мл, по 0,5 мл, 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл 20 % суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия в шприце по 0,875 мл, 0,1375 мл, 1,75 мл, 2,625 мл	Rp.: Tabl. Paliperidoni 3 mg D.t.d. №28 in tab. prolongatis *S. По 1 таб. 1 раз в сутки утром независимо от приема пищи. Rp.: Susp. Paliperidoni 10%- 0,5ml D.*S. В/м 0,5мл. 1 раз в 3 месяца	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТТ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AX13 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
95	Пароксетин (Адепресс, Актапароксетин, Паксил, Плизил, Плизил Н, Рексетин, Сирестилл)	таблетки по 20 мг 1 % раствор, капли для приема внутрь во флаконах	Rp.: Tabl. Paroxetini 20 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 1 таб. 1 раз в сутки, утром, во время еды	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТТ Антидепрессант код АТХ N06AB05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
96	Перициазин (Неулептил)	капсулы по 5 мг капсулы по 10 мг 4 % раствор для приема внутрь во флаконах	Rp.: Periciazini 5 mg D.t.d. № 50 in caps S.1 капсула 3-4 раза в сутки, большую часть суточной дозы принимают в вечерние часы. Rp.: Sol. Periciazini 4%-125 ml D.*S.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТТ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AC01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
97	Перфеназин (Этаперазин)	таблетки по 4 мг таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Perphenazini 4 mg D.t.d. №50 *S. По 1 таб. 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТТ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Пипофезин (Азафен)	таблетки по 25 мг с модифицированным высвобождением по 150 мг	Rp.: Tabl. Pipofezini 25 mg D.t.d. №50 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
99	Пирлиндол (Пиразидол)	таблетки по 25 мг таблетки по 50 мг	Rp.: Tabl. Pirlindoli 50 mg D.t.d. №50 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
100	Прегабалин (Альгерика, Лирика, Прабегин, Прегабио, Пригабилон, Реплика)	капсулы по 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг	Rp.: Pregabalini 75 mg D.t.d. №60 in caps *S. По 1 капсуле дважды в день	СВ (с 01.12.2019)	+		148-1/y-88		ФТГ Противозипелитическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
101	Промазин	таблетки по 25 мг	Rp.: Tabl. Promazini 25 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таб. каждые 6 часов	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AA03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
102	Пропионилфенилэтоксиэти лпиперидин (Просидол)	таблетки зашечные 20 мг	Rp.: Tabl. Propionilphenyletoху- aethylpiperidini 20 mg D.t.d. № 10 (десять) *S. Буккально по 1 таблетке	НС	+	х	специальны й рецептурны й бланк 107/y-НП	50 таблеток	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство хранятся в аптечной организации 5 лет
103	Псевдоэфедрин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Пчелиный яд (за исключением лекарственных форм для наружного применения - кремы, мази, гели)	в чистом виде не применяется		яв	+		-		
105	Рisperидон (Лептинорм, Нейпилепт, Ридонекс, Рилепт, Рилептид, Рисдолнал, Риспаксол, Риспен, Рисполепт, Рисполепт Квиклет, Рисполепт Конста, Рисполокс, Риссет)	таблетки по 0,5 мг, по 1 мг, по 2 мг, по 3 мг, по 4 мг таблетки для рассасывания по 0,5 мг, по 1 мг, по 2 мг 0,1 % раствор для приема внутрь во флаконах порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия по 25 мг и по 37,5 мг во флаконах	Rp.: Tabl. Risperidoni 1 mg D.t.d. №20 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки. Rp.: Sol. Risperidoni 0,1%-30 ml. D.*S. Внутрь 4 мл 1 раз в сутки Rp.: Risperidoni 25 mg D.t.d. №5 *S. В/м 25мг.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AX08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
106	МНН нет, ТН Селанк®	капли назальные 0,15 % раствор	Rp.: Guttae nasale «Selank» 0,15% 3 ml D.S. По 2 капли в каждую ноздрю	ЛП по коду АТХ			107-1/y ^s		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Серная кислота, исключая её соли, (в концентрации 45% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
108	Сертиндол (Сердолект)	таблетки по 12 мг	Rp.: Tabl. Serindoli 12 mg D.t.d. №28 *S.1 таб. внутрь один раз в день, вне зависимости от приема пищи	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
109	Сертралин (Алевал, Асентра, Золофт, Серената, Серлифт, Стимулотон, Торин)	таблетки по 25 мг таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Rp.: Tabl. Sertralini 25 mg D.t.d. №28 *S.1 таб. внутрь один раз в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB06 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
110	Сибутрамин (Голдлайн, Линдакса, Слимия)	капсулы по 10 мг капсулы по 15 мг	Rp.: Sibutramini 15 mg D.t.d. № 30 in caps. *S. Внутрь 1 капсула утром запить достаточным количеством воды	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Регуляторы аппетита, ожирения средство лечения рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
111	Соляная кислота, исключая её соли, (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
112	Суворексант (Белсомра)	таблетки по 15 мг	Rp.: Tabl. Suvorexanti 15 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь 1 таблетку на ночь	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CM19 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Сульпирид (Сульпирид Белупо, Бетамакс, Просульпин, Эглонил)	таблетки по 50 мг, 100 мг, по 200 мг капсулы по 50 мг, по 200 мг 4 % раствор для приема внутрь во флаконах 5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Sulpiridi 50 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки Rp.: Sulpiridi 50 mg D.t.d. №24 in caps. *S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в сутки Rp.: Sol. Sulpiridi 4%- 150 ml D.*S. Rp.: Sol. Sulpiridi 5%- 2 ml D.t.d. №10 in amp * S.B/м 2мл.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05A101 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
114	1-тестостерон за исключением лекарственных форм для наружного применения - кремы, мази, гели (Небидо, Андриол ТК, Омнадрен 250, Сустанон-250)	1% масляный растор в ампулах по 1 мл для инъекций 5% масляный растор в ампулах по 1 мл для инъекций 25% масляный растор в ампулах по 1 мл для инъекций 25% масляный растор в ампулах по 4 мл для инъекций капсулы по 40 мг	Rp.: Sol. Testosteroni oleosae 10 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. Внутримышечно 1 мл через 1-2 дня Rp.: Testosteroni 40 mg D.t.d. № 30 in caps *S. Внутрь 1 капсула 2 раза в сутки	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Андрогены, антиандрогены рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	1-тестостерон лекарственные формы для наружного применения - кремы, мази, гели (Андрогель)	гель для наружного применения 1 %	Rp.: Gel. Testosteroni 1%-75,0 D.*S. Наносить тонким слоем 1 раз в сутки	СВ			107-1/у ⁵	-	ФТГ Андрогены, антиандрогены
116	Тапентадол (Палексия)	таблетки продолжительного действия по 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 250 мг	Rp.: Tapentadol 50 mg D.t.d. № 20 in tab. prolongatis *S. Внутрь по 1 табл. 2 раза в день	СВ (с 01.12.2019)	+	-	148-1/у-88	-	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
117	Тетраметилтетраазабицикл ооктандион (Адаптол, Мебикар, Мебикс)	таблетки по 300 мг таблетки по 500 мг	Rp.: Tabl. Tetramethyltetraazabi- cyclooctandioni 500 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
118	Тианептин (Коаксил)	таблетки по 12,5 мг	Rp.: Tianeptini 12,5 mg D.t.d. № 30 in tab. *S. Внутрь, перед едой, по 1 таблетке 3 раза в сутки.	IVB Списка III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Антидепрессанты рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
119	Тиоприд (Тиопридал)	таблетки по 100 мг 5% раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Tiapridi 100 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 2 таблетке 2 раза в сутки Rp.: Sol. Tiapridi 5%- 2 ml D.t.d. №30 in amp *S. В мышцу по 2мл 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AL03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Тиопентал натрия	порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения флаконы по 0,5 г и 1,0 г	стационарный ЛП, используется для наркоза	СВ	+		-		используется для наркоза в условиях стационара, по рецептам не отпускается
121	Тиопроперазин (Мажептил)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Thioroprazini 10 mg D.t.d. №20 * S.Внутрь по 1/2 таблетки 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
122	Тиоридазин (Сонапакс, Тиодазин, Тиорил, Тисон)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг драже по 25 мг	Rp.: Tabl. Thioridazini 10 mg D.t.d. №25 * S.Внутрь по 2 и 1/2 таблетки 1 раз в сутки Rp.: Dragee Thioridazini 25 mg D.t.d. №60 * S.Внутрь по 1 драже 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AC02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
123	Толуол (в концентрации 70% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
124	Тофизолам (Грандаксин)	таблетки по 50 мг	Rp.: Tabl. Tofisorami 50 mg D.t.d. №20 * S.Внутрь по 2 таблетки 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BA23 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Тразодон (Тригитико)	таблетки пролонгированного действия по 150 мг	Rp.: Trazodoni 150 mg D.t.d. №20 in tab. prolong. *S. Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
126	Трамadol (Трамал, Трамадол, Ретард, Трамадол ГР)	капсула по 50 мг таблетки по 50 мг и 100 мг таблетки пролонгированного действия по 100 мг, 150 мг и 200 мг капли для приема внутрь 10 % раствор суппозитории ректальные по 100 мг 5 % раствор в ампулах по 1 мл или 2 мл для инъекций	Rp.: Tramadol 50 mg D.t.d. № 20 in caps. *S. Внутрь 1 капсулу при болях Rp.: Sol. Tramadol 10%- 10ml D.*S. По 20 капель при болях Rp.: Sol. Tramadol 5%- 2 ml D.t.d. №10 in amp *S. Внутрь по 2 мл при болях Rp.: Supp. cum Tramadol 0,1 D.t.d. № 10 *S. В прямую кишку по 1 свече Rp.: Tramadol 150 mg D.t.d. № 20 in tab. prolongatis *S. Внутрь по 1 табл. 1 раз в день	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Анальгезирующее средство со смешанным механизмом действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
127	Трамалола 37,5 мг + парацетамол 325 мг (Залдиар, Рамлеса, Трамалега, Форсодол)	таблетки капсулы	Rp.: Tramadol 37,5 mg Paracetamoli 325 mg D.t.d. №20 in tab. *S. Внутрь по 2 таблетки 1 раз в сутки Rp.: Tramadol 37,5 mg Paracetamoli 325 mg D.t.d. №10 in caps. *S. Внутрь по 2 капсулы 1 раз в сутки	ЛП, подлежащий ПКУ и содержащий СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Анальгезирующее средство со смешанным механизмом действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	Тригексифенидил (Циклодол)	таблетки по 2 мг	Rp.: Tabl. Trihexphenidyl 2 mg D.t.d. № 50 *S. Внутрь, начальная доза 0,5-1 мг/сут, при необходимости доза увеличивается до 5-10 мг/сут	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТТ Холиноблокатор центральный рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
129	Тримеперидин (Промедол)	1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций таблетки по 25 мг	Rp.: Trimeperidini 25 mg D.t.d. №50 (пятьдесят) in tab. *S. Внутрь по 1 табл. при болях Rp.: Sol. Trimeperidini 10 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 20 (двадцать) in amp. *S. Вводить внутримышечно 1мл при болях	НС	+	х	специальны й рецептурны й бланк 107/у-НП	20 ампул (шприц- тюбиков); 50 таблеток по 25 мг ²	ФТТ Опиоидные анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
130	Трифлуоперазин (Трифтазин)	таблетки по 5 мг 0,2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Trifluoperazini 5mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1/2 таблетки 2 раз в сутки Rp.: Sol. Trifluoperazini 0,2% - 1 ml D.t.d. №10 in amp *S. В мышцу 1 мл 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТТ Нейролептик, противорвотное средство код АТХ N05AB06 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
131	Трихлорметан (Хлороформ)	не лекарственным средством	является	СВ	+		148-1/у-88	-	рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	Тропирамид (Мидриатикум-Штульн ПУ, Мидриацил)	0,5 % раствор, капли глазные 1 % раствор, капли глазные	Rp.: Sol. Tropicamidi 0,5 % - 5 ml D. *S. В каждый глаз по 2 капли. Между каплями следует соблюдать интервал в 5 минут.	СВ (с 01.12.2019)	+		148-1/у-88		ФТГ М-холиноблокатор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
133	Уксусная кислота (в концентрации 80% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++				отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
134	Фенилпропаноламин (в концентрации 10% и более)	в субстанция		прекурсор НС и ПВ	+				отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
135	Фенобарбитал	таблетки по 5 мг таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Rp.: Phenobarbitali 100 mg D.t.d. № 50 in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	50 таблеток по 100 мг, 50 мг, 5 мг, 1, 2	ФТГ Противозипелитические средства, Снотворные средства рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
136	Фенобарбитала 0,025 г (25 мг), бромизовала 0,1 г (100 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,0075 г (7,5 мг), папаверина гидрохлорида 0,015 г (15 мг), (Паглюферал 1)	таблетки	Rp.: Phenobarbitali 0,025 Bromisoval 0,1 Calcii gluconatis 0,25 Coffeini natrio-benzoatis 0,0075 Papaverini hydrochloridi 0,015 D.t.d. № 10 in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТГ Противозипелитическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	фенобарбитала 0,025 г (25 мг), бромизовала 0,1 г (100 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,0075 г (7,5 мг), папаверина гидрохлорида 0,035 г (35 мг), (Паглюферал 2)	таблетки	Rp.: Phenobarbitali 0,025 Bromisovali 0,1 Calcii gluconati 0,25 Coffeini natrio-benzoatis 0,0075 Papaverini hydrochloridi 0,035 D.t.d. № 10 in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТТ Противозипилептическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
138	фенобарбитала 0,05 г (50 мг), бромизовала 0,15 г (150 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,01 г (10 мг), папаверина гидрохлорида 0,02 г (20 мг) (Паглюферал 3)	таблетки	Rp.: Phenobarbitali 0,05 Bromisovali 0,15 Calcii gluconatis 0,25 Coffeini natrii-benzoatis 0,01 Papaverini hydrochloridi 0,02 D.t.d. № 10 in tab. *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТТ Противозипилептическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н
139	фенобарбитала 0,02 г (20 мг), бендазола 0,02 г (20 мг), метамизола натрия 0,25 г (250 мг), папаверина гидрохлорида 0,02 г (20 мг) (Андипал)	таблетки	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,00129 г (1,29 мг), хмеля соплодий масла 0,00018 г (0,18 мг), фенобарбитала 0,0184 г (18,4 мг) , этилбромизовалерианата 0,0184 г (18,4 мг) (Валокордин)	капли для приема внутрь	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве
141	В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,00142 г (1,42 мг), фенобарбитала 0,01826 г (18,26 мг) , этилбромизовалерианата 0,02 г (20 мг) 1 таблетка: этилбромизовалерианата 0,0082 г (8,2 мг), фенобарбитала 0,0075 г (7,5 мг), мяты перечной листьев масла 0,00058 г (0,58 мг) (Корвалол)	капли для приема внутрь	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве
142	В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,0014 г (1,4 мг), испанского хмелевого масла (душицы масла) 0,0002 г (0,2 мг), фенобарбитала 0,02 г (20 мг) , этилбромизовалерианата 0,02 г (20 мг) (Валосердин)	капли для приема внутрь	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Фентанил (Дюрогезик Матрикс, Фендивия, Матрикс, Резервуар)	0,005% раствор в ампулах по 1 мл и 2 мл для инъекций трансерминальные терапевтические системы (ТТС) в дозировках по 12,5 мкг/час, 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час таблетки подязычные по 0,1 мг; 0,2 мг; 0,3 мг; 0,4 мг; 0,6 мг; 0,8 мг спрей назальный: 50 мкг/доза по 2 мл (10 доз), по 3,2 мл (20 доз), по 5 мл (40 доз); 100 мкг/доза по 2 мл (10 доз), по 3,2 мл (20 доз), по 5 мл (40 доз); 200 мкг/доза по 2 мл (10 доз), по 3,2 мл (20 доз), по 5 мл (40 доз).	Rp.: STT Phentaniil 75 mkg/h D.t.d. № 10 *S. Пластырь наклеивать на кожу на 72 часа. Rp.: Tabl. Phentaniil 0,1 mg D.t.d. № 20 (двадцать) *S. По 1 таблетке под язык при боли Rp.: Spr. nas. Phentaniil 50 mkg/d 5 ml (40 dos) D.t.d. № 2 (две) *S. по 1 дозе интраназально при прорывах боли	НС	+	Х	148-1/у-88 для трансерминал ьной формы; специальны й рецептурны й бланк 107/у-НП другие лекарственн ые формы	20 пластырей ТТС по 12,5 мкг/час; 20 пластырей ТТС по 25 мкг/час; 10 пластырей ТТС по 50 мкг/час; 10 пластырей ТТС по 75 мкг/час; 10 пластырей ТТС по 100 мкг/час 100 таблеток по 0,1 мг; 0,2 мг; 0,3 мг; 0,4 мг; 0,6 мг; 0,8 мг 24 флакона по 10 доз 50 мкг/доза 12 флаконов по 20 доз 50 мкг/доза 6 флаконов по 40 доз 50 мкг/доза 12 флаконов по 10 доз 100 мкг/доза 6 флаконов по 20 доз 100 мкг/доза 3 флакона по 40 доз 100 мкг/доза 12 флаконов по 10 доз 200 мкг/доза 6 флаконов по 20 доз 200 мкг/доза 3 флакона по 40 доз 200 мкг/доза ²	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство в ампулах используется для наркоза, по рецептам не отпускается; рецепты на ТТС хранятся в аптеке 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Флувоксамин (Феварин)	таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Rp.: Tabl. Fluvoxamini 100 mg D.t.d. №15 *S. Внутрь, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды 1 таб. однократно, вечером.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
145	Флуоксетин (Прозак, Профлузак, Флунисан)	капсулы по 10 мг капсулы по 20 мг	Rp.: Fluoxetini 20 mg D.t.d №30 in caps. *S. По 1 капсуле 1 раз в сутки в первой половине дня, независимо от приема пищи.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
146	Флулентинксол (Флюанксол)	таблетки по 0,5 мг таблетки по 1 мг	Rp.: Tabl. Flupentixoli 1 mg D.t.d №50 *S. По 1 таб. 4 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AF01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
147	Флуфеназин (Модитен Делю)	2,5 % масляный раствор в ампулах (флаконах) по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Phthorphenazini oleosae 2,5 % - 1 ml D.t.d. №20 in amp. *S. Глубоко внутримышечно в ягодичную область, 0,5 мл	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
148	Хлордиазепоксид (Элениум)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Chlordiazepoxidi 10 mg D.t.d №20 *S. По 1 таб. 1 раз в сутки за 1-2 ч до сна.	ЛП по коду АТХ	+	х	148-1/y-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Хлордизепоксид 0,005 г (0,01 г), амитриптилин 0,0125 г (0,025 г) (Амиксид)	таблетки	Rp: Chlordiazepoxid 0,01 Amitriptylin 0,025 D.t.d. №30 in tab. *S. Внутрь по 1 таб. 2-3 раза в день после еды.	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант+анксиолитическое средство (транквилизатор) содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 4 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
150	Хлорпромазин (Аминазин)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг драже по 25 мг 2,5 % раствор в ампулах по 1 мл, по 2 мл, по 5 мл, по 10 мл для инъекций	Rp: Tabl. Chlorpromazini 100 mg D.t.d №30 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки. Rp.: Sol. Chlorpromazini 2,5 % - 1 ml D.t.d. №20 in amp. *S. Внутримышечно по 1 мл 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AA01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
151	Хлорпрогиксен (Труксал)	таблетки по 15 мг таблетки по 50 мг	Rp: Tabl. Chlorprothixeni 50 mg D.t.d №50 *S. Поддерживающая доза по 1 таблетке 2 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AF03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
152	Циклопентолат (Цикломед, Циклопентолат-СОЛОфарм, Циклоптик)	1 % раствор, капли глазные	Rp.: Sol.Cyclopentolati 1 % - 5 ml D.*S.Закапывать в конъюнктивный мешок по 1 капле 3 раза в день	ЛП, подлежащий ПКУ	+		148-1/y-88	-	ФТГ М-холиноблокатор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
153	Циталопрам (Опра, ПРАМ, Сиозам, Уморал, Ципрамил, Циталифт, Циталон, Цитол)	таблетки по 10 мг таблетки по 20 мг таблетки по 40 мг	Rp.: Tabl. Citaloprami 10 mg D.t.d №30 *S.Внутрь по 1 таблетке один раз в сутки (не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости).	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AB04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Эргометрин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
155	Эрготамин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
156	эрготамина тартрата 0,0003 г (0,3 мг), фенобарбитала 0,02 г (20 мг) и суммы алкалоидов красавки 0,0001 г (0,1 мг) (Беллатаминал)	таблетки	Rp.: Ergotamini tartratis 0,3mg Phenobarbitali 20 mg Belladonnae alkaloids 0,1mg D.t.d № 30 in tab. *S. Внутрь, по 1 табл. 2-3 раза в день после еды.	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Седативные средства в комбинациях содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "ж" п. 4 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
157	эрготамина тартрат 0,001 г (1 мг), кофеин 0,0915 г (91,5 мг) (Кофетамин)	таблетки	Rp.: Ergotamini tartratis 1 mg Coffeini 91,5 mg D.t.d №10 in tab. *S. Внутрь по 1-2 табл. во время приступа головной боли 2 раза в день	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Психостимуляторы в комбинациях содержит прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н
158	эрготамина тартрат 0,00075 г (0,75 мг), пропифеназон 0,2 г (200 мг), кофеин 0,08 г (80 мг), камилофина хлорид 0,025 г (25 мг), меклоксамин цитрат 0,02 г (20 мг) (Номигрен)	таблетки	Rp.: Ergotamini tartratis 0,75 mg Propyphenazoni 200 mg Coffeini 80 mg Camylofini chloridi 25mg Mecloxamini citrati 20 mg D.t.d №20 in tab. *S. Для первого приема рекомендуемая доза 1-2 табл.	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Противомигренозное средство содержит прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	МНН нет, ТН Синкаптон состав: эрготамин тартрат 0,001 г (1 мг), кофеин 0,1 г (100 мг), дименгидрилат 0,025 г (25 мг)	таблетки	Рр.: Tabl. «Synkarton» №20 D.*S. При первых симптомах приступа мигрени принять 1 таблетку	комбинированный ЛП			107-1/y ⁵		ФТГ Альфа-адреноблокаторы в комбинациях содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
160	Эсциталопрам (Ленуксин, Мирацитол, Селектра, Ципралекс, ЭйСИПИ, Элиция, Элиция Кутаб)	таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки диспергируемые в полости рта по 5 мг	Рр.: Tabl. Escitaloprami 10mg D.t.d №14 *S. Внутрь по 1 таблетке один раз в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AB10 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
161	Этанол (Спирт этиловый)	флаконы	Рр.: Sol. Aethanoli 70% - 100 ml D.*S. Для дезинфекции инъекционного поля .	ЛП, подлежащий ПКУ и содержащий СВ	+		148-1/y-88		ФТГ Антисептики и дезинфицирующие средства рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
162	Этифоксин (Стрезам)	капсулы по 50 мг	Рр.: Etifoxini 50 mg D.t.d. № 24 in caps. *S. Внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки .	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство код АТХ N05BX03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
163	Эфедрин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		148-1/y-88	нет (в ред. от 02.03.2020)	отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	Эфедрин 5% раствор в ампулах	5 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Ephedrini 5 % - 1 ml D.t.d. №10 in amp. *S. Для подкожного введения 1 мл раствора 1-2 раза в день.	меры контроля не установлены			107-1/у ⁵		ФТГ Гипертензивные средства, Адрено- и симпатомиметики (альфа-, бета-)
165	МНН нет, ТН Теофедрин-Н состав: эфедрина гидрохлорид 0,02 г (20 мг), фенобарбитал 0,02 г (20 мг), теофиллин 0,1 г (100 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), парацетамол 0,2 г (200 мг), экстракт красавки 0,003 г (3 мг), цитизин 0,0001 г (0,1 мг)	таблетки	Rp: Tabl. «Theophedrin-H» №30 D.*S: для купирования приступов бронхиальной астмы однократно по 2 табл.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	на курс лечения до 60 дней ¹	ФТГ Теофиллин в комбинации с другими препаратами, кроме психолептиков рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "и" п.5 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
166	на 125 г сиропа: глауцина гидробромида 0,125 г (125 мг), эфедрина гидрохлорида 0,1 г (100 мг), масла базилика обыкновенного 0,125 г (125 мг) (Бронхотон, Бронхолитин, Бронхоцин, Бронхотусен Врамед)	сироп	Rp.: Glaucini hydrobromidi 0,125 Ephedrini hydrochloridi 0,1 Ocini basilici olei 0,125 Sacchari syrupi 125,0 D.*S. по 10 мл 3-4 раза в день.	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое средство центрального действия+симпатомиметическое средство прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "б" п. 4 приказа Минздрава от 17.05.2012 № 562н
167	Эфир дитиловый (Эфир для наркоза стабилизированный) в концентрации 45% или более	жидкость ингаляций	для	прекурсор НС и ПВ	+		148-1/у-88 (для изготовления экстренных ЛС)	-	используется для наркоза, в чистом виде по рецептам не отпускается; отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Примечания:

¹ Рецепты на производные барбитуровой кислоты, комбинированные лекарственные препараты, содержащие коден (его соли), иные комбинированные лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью в соответствии с основными фармакологическими действиями, для лечения пациентов с хроническими заболеваниями могут оформляться на курс лечения до 60 дней.
В случае, если курс лечения составляет более 30 дней дополнительно медицинский работник делает пометку "по специальному назначению", заверяет это указание своей подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации "Для рецептов" (основание - пункт 25 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 14.01.2019 № 4н;

² в соответствии с пунктом 16 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 14.01.2019 № 4н количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III Перечня, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт;

³ в соответствии с инструкцией по применению;

⁴ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";

⁵ в соответствии с пунктом 24 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 14.01.2019 № 4н пациентам с заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах одного календарного года. При выписывании таких рецептов медицинских работников делает пометку "по специальному назначению", указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность (ежедневно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации "Для рецептов".

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного Кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного Кодекса РФ";

СВ - сильнодействующее вещество;

ЯВ - ядовитое вещество;

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ";

НС - наркотическое средство;

ПВ Списка II - психотропное вещество Списка II;

ПВ Списка III - психотропное вещество Списка III;

прекурсор НС и ПВ - прекурсор наркотических средств и психотропных веществ;

комбинированный ЛП - лекарственный препарат для медицинского применения, содержащий кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества, в соответствии с приказами Минздрава и приказами России от 16.03.2010 № 157н "Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропного вещества и их прекурсоров, содержащегося в препаратах" и от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества";

ЛП, подлежащий ПКУ - иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, в соответствии с пунктом IV приложения к приказу Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

ЛП, подлежащий ПКУ и содержащий СВ - лекарственный препарат, содержащий в составе сильнодействующее вещество и подлежащий предметно-количественному учету, в соответствии с пунктом II приложения к приказу Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ЛП по коду АТХ - лекарственные препараты, относящиеся по АТХ к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), спнотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету, рецепты на которые остаются в аптечной организации и хранятся в течение трех месяцев в соответствии с пунктом 14 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденную приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н.

ФПГ - фармако-терапевтическая группа

"+" в соответствии с приказом Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

"++" в соответствии с Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9.06.2010 № 419
 *режим дозирования врач выбирает самостоятельно в зависимости от характера и тяжести заболевания