



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)
ПРИКАЗ

17. 09. 2024

№ 2208-н

г. Екатеринбург

**Об утверждении регионального календаря профилактических прививок
Свердловской области**

В целях совершенствования организации работы по иммунопрофилактике, предотвращения эпидемического распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1) региональный календарь профилактических прививок Свердловской области (приложение № 1);
 - 2) порядок проведения профилактических прививок регионального календаря профилактических прививок Свердловской области (приложение № 2);
2. Руководителям медицинских организаций в Свердловской области, осуществляющих деятельность по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, обеспечить:
 - 1) ежегодное планирование профилактических прививок на основании регионального календаря профилактических прививок Свердловской области (приложение № 1);
 - 2) проведение обучения медицинских работников по вопросам реализации регионального календаря профилактических прививок Свердловской области;
 - 3) иммунизацию населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области (приложение № 1) и порядком проведения профилактических прививок регионального календаря профилактических прививок Свердловской области (приложения № 2);
 - 4) безопасность проведения иммунизации населения и надлежащие условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов в медицинских организациях в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

5) организацию информационно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций частной формы собственности проводить иммунизацию населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области и порядком проведения профилактических прививок регионального календаря профилактических прививок Свердловской области (приложения № 1,2).

4. Председателю иммунологической комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области ежегодно до 15 июля предоставлять предложения иммунологической комиссии о необходимости закупа иммунобиологических препаратов из средств областного бюджета.

5. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.08.2022 № 1811-п «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения Свердловской области С.Б. Туркова.

Министр



А.А. Карлов

Региональный календарь профилактических прививок Свердловской области

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
1.	Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против гепатита В	Федеральный бюджет
2.	Новорожденные на 3 - 7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза	Федеральный бюджет
3.	Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против гепатита В	Федеральный бюджет
4.	Дети 2 месяца	Третья вакцинация против гепатита В (группы риска)	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против ротавирусной инфекции	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
5.	Дети 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
		Вторая вакцинация против ротавирусной инфекции	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
6.	Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
		Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
		Вторая вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет
		Третья вакцинация против ротавирусной инфекции	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
7.	Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
		Третья вакцинация против гепатита В	Федеральный бюджет
		Третья вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
8.	Дети 9 месяцев	Первая вакцинация против менингококковой инфекции	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
		Первая вакцинация против ветряной оспы	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
9.	Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	Федеральный бюджет
		Четвертая вакцинация против гепатита В (группы риска)	

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
10.	Дети 13 месяцев	Вторая вакцинация против менингококковой инфекции	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
11.	Дети 15 месяцев (1г. 3 мес.)	Ревакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против клещевого энцефалита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
12.	Дети 18 месяцев (1 г. 6 мес.)	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
		Первая ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
13.	Дети 20 месяцев (1 г. 8 мес.)	Вторая ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Первая вакцинация против гепатита А	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
14.	Дети 21 месяц (1 г. 9 мес.)	Вторая вакцинация против клещевого энцефалита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
15.	Дети 26 месяцев (2 г. 2 мес.)	Вторая вакцинация против гепатита А	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
16.	Дети 33 месяцев (2 г. 9 мес.)	Первая ревакцинация против клещевого энцефалита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
	Дети с 5 лет 9 месяцев и старше	Вторая и последующие ревакцинации против клещевого энцефалита	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
17.	Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	Федеральный бюджет
		Третья ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
		Вторая вакцинация против ветряной оспы	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
18.	Дети 6 - 7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка	Федеральный бюджет
		Вторая ревакцинация против коклюша	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
		Ревакцинация против туберкулеза	Федеральный бюджет
19.	Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка	Федеральный бюджет
		Третья ревакцинация против коклюша	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
20.	Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации	Федеральный бюджет
21.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет (включительно), медицинские работники без ограничения по возрасту	Вакцинация против гепатита В	Федеральный бюджет
22.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно)	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи	Федеральный бюджет
23.	Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), взрослые старше 36 лет, относящиеся к группам риска	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори	Федеральный бюджет
24.	Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов образовательных учреждений; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям	Вакцинация против гриппа ежегодно	Федеральный бюджет и иные источники финансирования
25.	Лица старше 18 лет не болевшие и/или не против новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; лица с первичным или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями	Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Повторная вакцинация (ревакцинация) проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации.	Областной бюджет и иные источники финансирования

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
26.	Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии. Вакцинация проводится с 7 лет однократно, ревакцинация каждые 5 лет	Против туляремии	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
27.	Лица, временно или постоянно находящиеся на территории природного очага, при осложнении эпизоотической и эпидемиологической обстановки. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы	Против чумы	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
28.	В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы: - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; - по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза	Против бруцеллеза	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
29.	Лица, выполняющие следующие работы: - ветеринарные работники и другие лица, профессионально	Против сибирской язвы	Областной бюджет (по эпидемиологическим показаниям), бюджет муниципальных

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш; - сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения; - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы		образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
30.	С профилактической целью вакцинируют следующих лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства; ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных. Вакцинация проводится по схеме 0-7-30 дней, первая ревакцинация проводится через год, последующие ревакцинации каждые три года.	Против бешенства	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
31.	Лица, выполняющие следующие работы: -по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; -по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных; -по отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза	Против лептоспироза	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
32.	Лица старше 60 лет и лица, привлекаемые к тушению лесных пожаров; лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях, лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: -сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; -по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита	Против клещевого вирусного энцефалита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
33.	Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку	Против лихорадки Ку	Средства работодателей и другие источники, не запрещенные законодательством
34.	Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы). Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки. Вакцинация проводится с возраста 9 месяцев, ревакцинация через 10 лет	Против желтой лихорадки	Средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
35.	Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы) Население субъектов Российской	Против холеры	Средства граждан, средства работодателей и другие источники, не запрещенные

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации. Вакцинация проводится с 2-х летнего возраста, ревакцинация - через 6 месяцев		законодательством,
36.	Население, проживающее на территориях, подверженных стихийным бедствиям (паводкам, стихийным бедствиям, крупным авариям на водопроводной и канализационной сети) по эпидемическим показаниям. Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа. Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.	Против брюшного тифа	Областной бюджет
37.	Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов). Лица, выезжающие гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).	Против брюшного тифа	Бюджет муниципальных образований, средства работодателей и другие источники, не запрещенные законодательством
38.	Контактные в очагах гепатита А (вне зависимости от возраста), население, проживающее на территориях, подверженных стихийным бедствиям (паводкам, стихийным бедствиям, крупным авариям на водопроводной и канализационной сети) по эпидемическим показаниям, лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники пищеблоков и работники, обслуживающие	Против гепатита А	Областной бюджет

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети медицинских организаций)		
39.	Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусным гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (работники сферы обслуживания населения, в т.ч. занятые в организациях торговли продуктами питания, работники предприятий общественного питания, работники занятые на предприятиях пищевой промышленности, работники обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население; работники детских дошкольных учреждений и работники учреждений с круглосуточным пребыванием детей). Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость вирусным гепатитом А.	Против гепатита А	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
40.	Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля. Население, проживающее на территориях, подверженных стихийным бедствиям (паводкам, стихийным бедствиям, крупным авариям на водопроводной и канализационной сети) по эпидемическим показаниям, Работники пищеблоков и буфетных медицинских организаций	Против шигеллез	Областной бюджет
41.	Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства, работники молочно-товарных ферм, работники	Против шигеллез	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенных законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	молокоперерабатывающих предприятий, работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население, работники предприятий торговли скоропортящимися продуктами питания, работники специализированных цехов по производству кулинарных изделий, воспитатели и помощники воспитателей детских дошкольных учреждений. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и выезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям). Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.		
42.	Лица, подлежащие призыву на военную службу и контактные - (вне зависимости от возраста) с больным генерализованной формой менингококковой инфекции.	Против менингококковой инфекции	Областной бюджет
43.	В межэпидемический период иммунизации подлежат лица из групп высокого риска: - лица, выезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции районы; - работники медицинских организаций инфекционного профиля, - медицинские работники и сотрудники лабораторий, лица, работающих с живой культурой менингококка; - пациенты, воспитанники и персонал учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием; - лица, проживающие в общежитиях; - лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных	Против менингококковой инфекции	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	мероприятиях; - дети до 5 лет (включительно) и 13 - 17 лет (включительно); - лица старше 60 лет; - лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ- инфицированные; - лица, перенесшие кохлеарную имплантацию; - лица с ликвореей. Иммунизация проводится вакцинами, содержащими максимальное количество серогрупп.		
44.	Лица старше 60 лет, в том числе проживающие в организациях социального обслуживания; лица, подлежащие призыву на военную службу.	Против пневмококковой инфекции	Областной бюджет
45.	Дети в возрасте от 2 до 17 лет включительно (ранее не привитые), взрослые, относящиеся к группам риска: лица, работающие в организациях социального обслуживания; лица, занятые на работах с вредными для дыхательной системы производствах; медицинские работники; лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, органов сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, печени, почек, с иммуносупрессивными состояниями, онкологическими заболеваниями; лица, перенесшие COVID-19; реконвалесценты острого среднего отита, пневмонии, менингита; лица с иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ, онкологическими заболеваниями, получающие иммуносупрессивную терапию, в том числе кортикостероидами	Против пневмококковой инфекции	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
46.	Лица, подлежащие призыву на военную службу и контактные из очагов ветряной оспы в медицинских организациях	Против ветряной оспы	Областной бюджет

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
47.	Дети и взрослые из групп риска ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой; пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом; больные острым лейкозом; пациенты, получающие иммунодепрессанты, длительно получающие системные стероиды; пациенты, планируемые для проведения лучевой терапии; пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием; дети перед поступлением в детские дошкольные и школьные образовательные организации; дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации; женщины, планирующие беременность (не менее чем за 3 месяца); лица, подлежащие призыву на военную службу; медицинские работники; работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прежде всего, с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц;	Против ветряной оспы	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
48.	Дети до 5 лет	Против гемофильной инфекции	Федеральный бюджет
49.	Дети в возрасте 6-7 лет, подлежащие второй ревакцинации против коклюша, проживающие в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием	Против коклюша	Областной бюджет
50.	Лица старше 18 лет ревакцинируются каждые 10 лет, к приоритетным группам относятся: работники медицинских и образовательных учреждений, учреждений социального обеспечения, лица с хронической бронхолегочной патологией, с иммунодефицитными состояниями, взрослые в семьях, где есть новорожденные	Против коклюша	Бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	и не привитые дети до 1 года жизни, женщины, планирующие беременность, военнослужащие		
51.	Девочки 12 лет	Против папилломавирусной инфекции	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
52.	Лица обоих полов с 9 лет до 45 лет, ранее не привитые против папилломавирусной инфекции	Против папилломавирусной инфекции	Средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
53.	Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет	Против кори	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
54.	Контактные лица из очагов заболеваний (гепатиты В и С), не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против гепатита В	Против гепатита В	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
55.	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии	Против дифтерии	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
56.	Контактные лица из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые или не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита, или однократно привитые старше 6 лет	Против эпидемического паротита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
57.	Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание): Дети с 3 месяцев до 15 лет при наличии достоверных данных о предшествующих прививках - однократно; Медицинские работники – однократно. Дети, прибывшие из эндемичных	Против полиомиелита	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

№ п/п	Категории и/или возраст граждан, подлежащих иммунизации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
	(неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); Лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); Лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно инаktivированной полиомиелитной вакциной; Лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким полиовирусом, без ограничения возраста - однократно при приеме на работу		
58.	Контактные в очагах краснухи, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против краснухи	Против краснухи	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством
59.	При угрозе эпидемического подъема заболеваемости вакцинации дополнительно подлежат: дети до 8 лет (включительно), студенты первых курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. При продолжающемся росте заболеваемости менингококковой инфекцией дополнительно подлежат: обучающиеся общеобразовательных организаций, взрослое население (при обращении в медицинские организации)	Против менингококковой инфекции	Областной бюджет, бюджет муниципальных образований, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕГИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

І . Общие положения

1. Профилактические прививки регионального календаря профилактических прививок Свердловской области проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).

2. Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.

3. Профилактические прививки регионального календаря профилактических прививок Свердловской области, проводятся с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.

4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации или ревакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером), с занесением данных в соответствующую медицинскую документацию. После проведения вакцинации осуществляется медицинское наблюдение в течение 30 минут.

6. При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются вакцины, содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора.

7. Профилактические прививки могут проводиться с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, содержащих комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды.

8. При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам, предусмотренным национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, регионального календаря профилактических прививок Свердловской области, регионального календаря профилактических прививок Свердловской области по эпидемическим показаниям в один календарный день разными шприцами в разные участки тела (одномоментно). Прерванный цикл прививок не требует повторения предыдущих доз, вакцинация продолжается в соответствии с числом доз, необходимым ребенку на данный возраст. При изменении возрастных сроков вакцинации («догоняющая» вакцинация) ее проводят по схемам, предусмотренным национальным календарем и в соответствии с инструкциями по применению вакцин. Для вакцин, имеющих один и тот же антигенный состав, интервал в рамках первичного

комплекса прививок должен составлять минимум 1 месяц. Вместе с тем, в настоящее время в соответствии с международной практикой, допускается введение неживых вакцин с любым интервалом между собой, при введении живых вакцин рекомендуется интервал 1 месяц, между живой и неживой вакцинами, также допустим любой интервал. Интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин составляет 1 месяц (за исключением вакцинации новорожденных в роддоме против туберкулёза и гепатита В).

9. При проведении вакцинации против вирусного гепатита В детей первого года жизни, против гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных организациях, беременных женщин используются иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики, не содержащие консервантов.

10. Иммунизация детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями осуществляется в рамках регионального календаря профилактических прививок Свердловской области, регионального календаря профилактических прививок Свердловской области по эпидемическим показаниям (возможно - по индивидуальному графику прививок) и в соответствии с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов; проводится с учетом следующих факторов: ВИЧ-статус ребенка, вид вакцины (живая, инактивированная), показатели иммунного статуса, возраст ребенка, сопутствующие заболевания; вакцинация живыми вакцинами (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза) проводится детям с ВИЧ-инфекцией с 1-й и 2-й иммунными категориями (отсутствие иммунодефицита или умеренный иммунодефицит); анатоксины, убитые и рекомбинантные вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок вводят всем детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией указанные иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики инфекционных болезней вводятся при отсутствии выраженного и тяжелого иммунодефицита; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией иммунизация против полиомиелита проводится инактивированной вакциной независимо от их ВИЧ-статуса; вакцинация детей против туберкулеза, рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией и получавших трехэтапную химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (во время беременности, родов и начатой химиопрофилактике новорожденному), проводится в родильном доме вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); у детей с ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении у детей нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными методами вакцинация и ревакцинация против туберкулеза не проводится; при исключении диагноза ВИЧ-инфекции детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, проводят вакцинацию живыми вакцинами без предварительного иммунологического обследования.

11. Иммунизация в рамках регионального календаря вакцинами, не входящими в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, проводится за счет средств муниципальных образований, средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством. Объемы финансирования иммунизации за счет средств областного бюджета определены государственной программой Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года» (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1267-ПП). Финансирование из областного бюджета осуществляется в случае эпидемиологического неблагополучия на территории Свердловской области, угрозе вспышечной заболеваемости. Планирование финансовых средств на приобретение вакцин за счет областного бюджета проводить на основании заключения иммунологической комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области.

I I . Алгоритмы вакцинации по отдельным нозологическим формам

Туберкулез

Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3 - 7 день жизни вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6 - 7 лет проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). При отсутствии вакцинации против туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7 лет туберкулиноотрицательным детям.

Гепатит В

Вакцинация против гепатита В детей первого года жизни, детей от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет (включительно), медицинские работники без ограничения по возрасту не привитые ранее против вирусного гепатита В, не имеющие сведений о прививках против гепатита В проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

Вакцинация против гепатита В детей, относящихся к группам риска (родившимся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4-я доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

Полиомиелит

Против полиомиелита первая, вторая, третья вакцинации детям 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев жизни и первая ревакцинация против полиомиелита детям 18 месяцев жизни проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной); вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям 20 месяцев и 6 лет проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (живой). Дети, относящиеся к группе риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка, в учреждениях круглосуточного пребывания), подлежат второй и третьей ревакцинации против полиомиелита в 20 месяцев и 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).

Ветряная оспа

Вакцинация проводится двукратно с минимальным интервалом 3 месяца. Вакцинацию контактных проводят однократно 1 дозой вакцины (0,5 мл) в течение первых 72 часов.

Клещевой вирусный энцефалит

Вакцинация проводится двукратно с интервалом между инъекциями 1-7 месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками - 5-7 месяцев. При необходимости экстренной профилактики интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней. Первая ревакцинация проводится через год. Последующие ревакцинации - в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года. Прививки проводятся в

течение всего года, в том числе - в летний период, но не позднее чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.

Дифтерия

Вторая и последующие ревакцинации против дифтерии и столбняка проводятся анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов, начиная с возраста 18 лет ревакцинация проводится каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

Вакцинация контактных против дифтерии проводится однократно, начиная с возраста 3-х месяцев, первая ревакцинация - с интервалом 6-9 месяцев от вакцинации, последующие ревакцинации каждые 10 лет.

Коклюш

Вторая ревакцинация детей в возрасте 6-7 лет и третья ревакцинация в возрасте 14 лет против коклюша проводятся ацеллюлярными вакцинами, зарегистрированными на территории РФ в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данных возрастных групп. Последующие ревакцинации против коклюша начиная с возраста 18 лет проводятся каждые 10 лет от момента последней ревакцинации ацеллюлярными вакцинами.

Пневмококковая инфекция

Вакцинация против пневмококковой инфекции проводится вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы. Дети, не относящиеся к группам риска, прививаются по схеме 2+1 (1 доза - в 2 месяца, 2 доза - через 4,5 месяца после 1 прививки, 3 доза в 15 месяцев). Дети, относящиеся к группам риска (недоношенные, ВИЧ-инфицированные, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, с хроническими воспалительными заболеваниями, получающими иммуносупрессивную терапию) прививаются по схеме 3+1 (1 доза в 2 месяца, 2 доза - с интервалом не менее 4 недель после 1 дозы, 3 доза - с интервалом не менее 4 недель после 2 дозы, 4 доза в возрасте 12-15 месяцев).

Пациентам с ВИЧ-инфекцией старше 5-лет и взрослым любого возраста вводят первую дозу 13-ти валентной пневмококковой конъюгированной вакциной (ПКВ13) и через 8 недель вводится 1 доза 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакцины (ППВ23). Повторная доза ППВ23 через 5 лет.

Детям в возрасте 2-17 лет, ранее не привитым и/или детям, относящимся к группам риска, в том числе находящимся в учреждениях закрытого типа, реконвалесцентам острого среднего отита, пневмонии, менингита, инфицированным микобактериями туберкулеза, часто болеющим респираторными инфекциями - однократно пневмококковой конъюгированной вакциной.

Детям и взрослым из групп риска по развитию тяжелой пневмококковой инфекцией ранее не привитым - первой однократно вводится доза 13-ти валентной пневмококковой конъюгированной вакциной (ПКВ13), через 12 месяцев (минимальный интервал может составлять 8 недель) от 1 дозы вводится 1 доза 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакцины (ППВ23). Если пациенты ранее были привиты ППВ23, то им показано введение 1 дозы ПКВ13, но не ранее, чем через 8 недель после ППВ23).

У пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток рекомендуется серия прививок, состоящая из 4 доз ПКВ13. Первая серия иммунизации состоит из введения трех доз вакцины с интервалом 1 мес., причем первая доза вводится с 3-го по 6-й мес. после трансплантации. Ревакцинирующую дозу рекомендуется вводить через 6 мес. после введения третьей дозы.

Пациентам в возрасте от 6 до 18 лет, страдающим серповидно-клеточной анемией, ранее вакцинированным ППВ23 как минимум за 6 мес., рекомендуется проводить двукратную иммунизацию ПКВ13 с интервалом 6 мес.

Вакцинация лиц призывного возраста проводится однократно любой доступной вакциной против пневмококковой инфекции в ходе прохождения приписной комиссии. Вакцинация медицинских работников проводится однократно любой доступной вакциной против пневмококковой инфекции, при отсутствии противопоказаний.

Гемофильная инфекция

Вакцинация против гемофильной инфекции проводится детям до 5 лет, особого внимания требуют дети, относящиеся к группам риска: иммунодефицитные состояния, приводящие к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; анатомические дефекты, приводящие к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; онкогематологические заболевания; длительно получающие иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; дети, находящиеся в домах ребенка.

Дети, не получившие первую вакцинацию в 3 месяца, иммунизируются по следующей схеме: в возрасте от 6 до 12 месяцев - 2 инъекции по 0,5 мл с интервалом в 1,5 месяца; в возрасте от 1 года до 5 лет - однократная инъекция 0,5 мл.

Менингококковая инфекция

Вакцинации против менингококковой инфекции подлежат лица в возрасте с 9 до 23 месяцев курс состоит из 2 инъекций по одной дозе вакцины (0,5 мл) с интервалом не менее 3 месяцев. Детям с 2 лет (включительно) и взрослым вакцинация проводится однократно в дозе 0,5 мл.

Конъюгированные вакцины предпочтительнее полисахаридные для популяционной защиты и их повышенной иммуногенности, особенно у детей в возрасте до 2 лет.

При использовании моновалентной конъюгированной вакцины (серотип В) детям 2-11 месяцев требуется 2 дозы, вводимые с интервалом не менее 2 месяцев, и доза-бустер через 1 год. Если первичный курс был прерван, вакцинацию следует возобновить без повторения предыдущей дозы.

Четырехвалентная конъюгированная вакцина вводится с 9 месяцев и назначается в виде курса из 2-х доз с интервалом в 3 месяца. Если первичный курс был прерван, вакцинацию следует возобновить без повторения предыдущей дозы.

Папилломавирусная инфекция

Вакцинация против папилломавирусной инфекции проводится детям (обоих полов) в возрасте 9 - 14 лет 2-хкратно по схеме 0 - 6 месяцев (при использовании бивалентной вакцины) и 9-13 лет 2-хкратно по схеме 0-6 месяцев (при использовании квадριвалентной вакцины); детям и взрослым 15 - 45 лет проводится 3-хкратно по схеме 0-1-6 месяцев (при использовании бивалентной вакцины); детям и взрослым 14 - 45 лет проводится 3-хкратно по схеме 0-2-6 месяцев (при использовании квадριвалентной вакцины). Иммунизация против папилломавирусной инфекции может проводиться как женщинам, так и мужчинам. Вакцинации против вируса папилломы человека подлежат дети с ВИЧ-инфекцией с 9 лет до 17 лет (обоих полов) 3-хкратно по схеме 0-1-6 месяцев (при использовании бивалентной вакцины) и по схеме 0-2-6 месяцев (при использовании квадριвалентной вакцины).

Корь

Вакцинация детей проводится в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. При нарушении схемы, вакцинации подлежат дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори с интервалом 6 месяцев – дети до 17 лет, с интервалом 3 месяца – взрослые 18 лет и старше.

Взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори

Работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность – не зависимо от возраста, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Вакцинацию по экстренным показаниям при контакте с больным корью проводят детям с 12 месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста, не болевшим корью и ранее не привитым против этой инфекции или привитым однократно лицам старше 6 лет. При отсутствии противопоказаний вакцину против кори вводят не позднее, чем через 72 часа после контакта с больным.

Краснуха

Вакцинация детей проводится в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. При нарушении схемы, вакцинации подлежат дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи.

Эпидемический паротит

Контактные дети и взрослые, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о прививках против эпидемического паротита, прививаются двукратно с интервалом 3 месяца.

Грипп

Вакцинации против гриппа ежегодно перед сезоном (сентябрь-ноябрь) подлежат дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов образовательных учреждений; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе работники детских дошкольных организаций, организаций торговли, общественного питания, транспорта, коммунальной и социальной сферы), птицеводческих хозяйств, промышленных предприятий; лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, ожирением и др.

Коронавирусная инфекция, вызываемой вирусом SARS-CoV-2

Лица старше 18 лет не болевшие и/или не против новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2;

лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

лица с первичным или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Вакцинация проводится через 12 месяцев после перенесенного заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2 или вакцинации.